


**Biotoptypen Rogätz-Nord
 Bestand 1999**



1:20000

Biotoptypen (detailliert)

- WAw Weichholzauwald
- WAh Hartholzauwald
- WUi Eichenmischwald
- WLi bodensaurer Eichenwald
- KFu Ufersaum
- KFr Röhrichte
- KGu Flutrasen
- KGf feuchtes Grünland
- KGM mittleres Grünland
- KGi Intensivgrünland
- KSf feuchte Staudenflur
- KSm mittlere Staudenflur
- KMa Sandmagerrasen
- KCc Reitgrasflur
- KCh Reitgrasflur
- AAu Acker



Biotoptypen

- WL Laubwald
- WU Laubmischwald
- WM Nadel-Laubmischwald
- WN Nadelwald
- WE Nadelmischwald
- WA Auwald
- WF Bruch-/Sumpfwald
- HH Hecke
- HU Gebüsch
- HN Gehölzpflanzung, standortfremd
- HG Baumgruppe
- HR Baumreihe
- HS Streuobstwiese
- KG Grünland
- KS Staudenflur
- KF Flachmoor/Sumpf
- GQ Quellbereich
- GB Bach/Graben
- GF Fluß/Kanal
- GK Stillgewässer <1 ha, naturnah
- GT Stillgewässer <1 ha, anthropogen
- GS Stillgewässer >1 ha, naturnah
- GA Stillgewässer >1 ha, anthropogen
- FN vegetationsfreie Fläche, naturnah
- FA vegetationsfreie Fläche, anthropogen
- AA Acker
- AG Erwerbsgartenbau
- BS Siedlungsfläche
- BG Grünfl. im bebauten Bereich
- BX Baustelle

